

# 1 節 指数関数

## 1 指数法則

$m, n$  が正の整数のとき、数学 I で学んだ次の **指数法則** が成り立つ。

$$\boxed{1} \quad a^m a^n = a^{m+n} \quad \boxed{2} \quad (a^m)^n = a^{mn} \quad \boxed{3} \quad (ab)^n = a^n b^n$$

### $a^0$ と $a^{-n}$

5

$a \neq 0$  とする。指数  $n$  が 0 または負の整数であるときにも、上の指数法則が成り立つように、 $a^n$  の意味を定めてみよう。

$n = 0$  のとき、指数法則 **1** が成り立つとすると

$$a^m a^0 = a^{m+0} = a^m \quad \text{ゆえに} \quad a^0 = 1$$

$m = -n$  のとき、指数法則 **1** が成り立つとすると

10

$$a^{-n} a^n = a^{-n+n} = a^0 = 1 \quad \text{ゆえに} \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

よって、指数が 0 または負の整数のときの累乗を次のように定める。

### $a^0, a^{-n}$ の定義

$a \neq 0$  で、 $n$  が正の整数のとき

$$a^0 = 1, \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

15

**例 1** (1)  $3^0 = 1$

(2)  $2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$

**問 1** 次の値を求めよ。

(1)  $5^{-1}$                       (2)  $6^0$                       (3)  $10^{-2}$                       (4)  $(-4)^{-3}$

**問 2** 次の式を  $a^n$  の形で表せ。

20

(1)  $\frac{1}{a}$                       (2) 1                      (3)  $\frac{1}{a^5}$                       (4)  $\frac{1}{a^{17}}$

## 指数法則

$a^0 = 1$ ,  $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$  と定めると, 前ページの指数法則は  $m$ ,  $n$  がどのような整数のときにも成り立つ。

**例 2**  $m = 3$ ,  $n = -2$  のとき, 前ページの指数法則 **1**, **2**, **3** が成り立つことを確かめてみよう。

$$\mathbf{1} \quad a^3 a^{-2} = a^3 \times \frac{1}{a^2} = a = a^{3+(-2)}$$

$$\mathbf{2} \quad (a^3)^{-2} = \frac{1}{(a^3)^2} = \frac{1}{a^6} = a^{-6} = a^{3 \times (-2)}$$

$$\mathbf{3} \quad (ab)^{-2} = \frac{1}{(ab)^2} = \frac{1}{a^2 b^2} = \frac{1}{a^2} \times \frac{1}{b^2} = a^{-2} b^{-2}$$

さらに,  $a \neq 0$ ,  $b \neq 0$  で,  $m$ ,  $n$  が整数のとき, 次のような計算を行うことができる。

$$a^m \div a^n = \frac{a^m}{a^n} = a^m \times \frac{1}{a^n} = a^m \times a^{-n} = a^{m-n}$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = (ab^{-1})^n = a^n (b^{-1})^n = a^n b^{-n} = \frac{a^n}{b^n}$$

以上より, 次の指数法則が成り立つことがわかる。

## 指数法則 1

$a \neq 0$ ,  $b \neq 0$  で,  $m$ ,  $n$  が整数のとき

$$\mathbf{1} \quad a^m a^n = a^{m+n}$$

$$\mathbf{1}' \quad a^m \div a^n = a^{m-n}$$

$$\mathbf{2} \quad (a^m)^n = a^{mn}$$

$$\mathbf{3} \quad (ab)^n = a^n b^n \qquad \mathbf{3}' \quad \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

**例 3** (1)  $a^3 \times a^{-9} \div a^{-4} = a^{3+(-9)-(-4)} = a^{-2} = \frac{1}{a^2}$

(2)  $(a^2)^3 \times (ab^3)^{-2} = a^6 \times a^{-2} \times b^{-6} = a^4 b^{-6} = \frac{a^4}{b^6}$

**問 3** 次の計算をせよ。

(1)  $a^{-2} a^5$       (2)  $x^{-7} \div (x^{-5} \times x^2)$       (3)  $(a^3 b^{-4})^{-2}$       (4)  $\left(\frac{x^{-2}}{y^3}\right)^{-5}$

## 2 累乗根

$a$  を実数とする。正の整数  $n$  に対して、 $n$  乗して  $a$  になる数、

すなわち 
$$x^n = a$$

を満たす数  $x$  を、 $a$  の  $n$  乗根 という。平方根は 2 乗根である。

**例 4** (1)  $(-2)^3 = -8$  であるから、 $-2$  は  $-8$  の 3 乗根

(2)  $(-2)^4 = 16$ ,  $2^4 = 16$  であるから、 $-2$ ,  $2$  は  $16$  の 4 乗根

5

この章では、 $n$  乗根は実数の範囲で考えるものとする。このとき、実数  $a$  の  $n$  乗根について、次のことがいえる。

(i)  $n$  が奇数のとき

$a$  の  $n$  乗根は  $a$  の正負に関係なく、ただ 1 つ存在する。それを  $\sqrt[n]{a}$  と表す。 $\sqrt[n]{a}$  と  $a$  の正負は同じである。

**例 5**  $(-2)^5 = -32$  であるから

$$\sqrt[5]{-32} = -2$$

(ii)  $n$  が偶数のとき

$a > 0$  のとき、 $a$  の  $n$  乗根は正と負の 2 つが存在する。そのうち正の方を  $\sqrt[n]{a}$ 、負の方を  $-\sqrt[n]{a}$  と表す。

$a < 0$  のとき、 $a$  の  $n$  乗根は存在しない。

**例 6**  $3^4 = 81$ ,  $(-3)^4 = 81$  であるから


$$\sqrt[4]{81} = 3, \quad -\sqrt[4]{81} = -3$$

**注意**  $\sqrt[n]{a}$  をこれまで通り  $\sqrt{a}$  と書く。また、 $n$  が奇数、偶数のいずれであっても  $\sqrt[n]{0} = 0$  である。


**問 4** 次の値を求めよ。

(1)  $\sqrt[3]{125}$       (2)  $\sqrt[3]{-125}$       (3)  $\sqrt[4]{256}$       (4)  $\sqrt[5]{-243}$

25



10



15

20

## 累乗根の性質

2 乗根, 3 乗根, 4 乗根, …をまとめて**累乗根**という。

$a > 0$  で,  $n$  が正の整数のとき,  $\sqrt[n]{a}$  は  $a$  のただ 1 つの正の  $n$  乗根である。すなわち

$$5 \quad a > 0 \text{ のとき} \quad (\sqrt[n]{a})^n = a, \quad \sqrt[n]{a} > 0$$

さらに, 累乗根について次の性質が成り立つ。

### 累乗根の性質

$a > 0, b > 0$  で,  $m, n, p$  が正の整数のとき

$$10 \quad \begin{array}{ll} \text{①} & \sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab} \\ \text{②} & \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}} \\ \text{③} & (\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m} \\ \text{④} & \sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a} \\ \text{⑤} & \sqrt[n]{a^{mp}} = \sqrt[n]{a^m} \end{array}$$

**証明** ① 左辺を  $n$  乗すると  $(\sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b})^n = (\sqrt[n]{a})^n (\sqrt[n]{b})^n = ab$

ここで,  $\sqrt[n]{a} > 0, \sqrt[n]{b} > 0$  であるから  $\sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b} > 0$

よって,  $\sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b}$  は  $ab$  の正の  $n$  乗根である。

すなわち  $\sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$

**問 5** 上の証明にならって, ③, ④ を証明せよ。

**例 7** (1)  $\sqrt[3]{4} \times \sqrt[3]{16} = \sqrt[3]{4 \times 16} = \sqrt[3]{4^3} = 4$

(2)  $\frac{\sqrt[6]{10}}{\sqrt[6]{2}} = \sqrt[6]{\frac{10}{2}} = \sqrt[6]{5}$

(3)  $\sqrt[3]{40} = \sqrt[3]{8 \times 5} = \sqrt[3]{8} \times \sqrt[3]{5} = 2\sqrt[3]{5}$

(4)  $\sqrt{\sqrt[3]{49}} = \sqrt[6]{7^2} = \sqrt[3]{7}$

**問 6** 次の計算をせよ。

(1)  $\sqrt[4]{400} \times \sqrt[4]{25}$

(2)  $\sqrt[4]{400} \div \sqrt[4]{25}$

(3)  $\sqrt[3]{\sqrt{216}}$

(4)  $(\sqrt[3]{4})^5 \div \sqrt[3]{64}$

### 3 指数の拡張

$a > 0$  のとき、有理数  $r$  に対して累乗  $a^r$  を定義しよう。

たとえば、指数法則 [2] の  $(a^m)^n = a^{mn}$  が、 $m = \frac{3}{4}$ 、 $n = 4$  のときにも成り立つとすると

$$\left(a^{\frac{3}{4}}\right)^4 = a^{\frac{3}{4} \times 4} = a^3$$

5

よって、 $a^{\frac{3}{4}}$  は  $a^3$  の正の4乗根であり、 $a^{\frac{3}{4}} = \sqrt[4]{a^3}$  となる。

このような考え方にしただけで、一般に次のように定義する。

#### 有理数を指数とする累乗

$a > 0$  で、 $m, n$  が正の整数のとき

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}, \quad a^{-\frac{m}{n}} = \frac{1}{\sqrt[n]{a^m}}$$

10

上のことから、とくに  $a^{\frac{1}{2}} = \sqrt{a}$ 、 $a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$  である。

**例 8** (1)  $8^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{8^2} = \sqrt[3]{64} = \sqrt[3]{4^3} = 4$

(2)  $16^{-\frac{3}{4}} = \frac{1}{\sqrt[4]{16^3}} = \frac{1}{\sqrt[4]{(2^4)^3}} = \frac{1}{\sqrt[4]{(2^3)^4}} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$

**問 7** 次の値を求めよ。

(1)  $16^{\frac{1}{4}}$       (2)  $27^{\frac{4}{3}}$       (3)  $36^{-\frac{1}{2}}$       (4)  $125^{-\frac{2}{3}}$

15

**問 8** 次の値を  $a^{\frac{m}{n}}$  の形で表せ。

(1)  $\sqrt[5]{a}$       (2)  $\sqrt[3]{a^5}$       (3)  $\sqrt{a^{-3}}$       (4)  $\frac{1}{\sqrt[3]{a^7}}$

有理数を指数とする累乗を上のように定めると

$$a^{\frac{1}{3}} a^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{a} \times \sqrt[3]{a^2} = \sqrt[3]{a \times a^2} = \sqrt[3]{a^{1+2}} = a^{\frac{1+2}{3}} = a^{\frac{1}{3} + \frac{2}{3}}$$

$$\left(a^{\frac{1}{3}}\right)^{\frac{2}{3}} = \left(\sqrt[3]{a}\right)^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{\left(\sqrt[3]{a}\right)^2} = \sqrt[3]{\sqrt[3]{a^2}} = \sqrt[9]{a^2} = a^{\frac{2}{9}} = a^{\frac{1}{3} \times \frac{2}{3}}$$

20

$$(ab)^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{(ab)^2} = \sqrt[3]{a^2 b^2} = \sqrt[3]{a^2} \times \sqrt[3]{b^2} = a^{\frac{2}{3}} b^{\frac{2}{3}}$$

となり、指数法則 [1]、[2]、[3] は、 $m = \frac{1}{3}$ 、 $n = \frac{2}{3}$  のときも成り立つことがわかる。

一般に、有理数を指数とする累乗についても、指数法則が成り立つ。

**指数法則 2**

$a > 0, b > 0$  で、 $p, q$  が有理数のとき

**1**  $a^p a^q = a^{p+q}$                       **1'**  $a^p \div a^q = a^{p-q}$

**2**  $(a^p)^q = a^{pq}$

**3**  $(ab)^p = a^p b^p$                       **3'**  $\left(\frac{a}{b}\right)^p = \frac{a^p}{b^p}$

指数法則を利用して、いろいろな計算を行ってみよう。

**例 9** (1)  $24^{\frac{1}{3}} \times 3^{\frac{2}{3}} = (2^3 \times 3)^{\frac{1}{3}} \times 3^{\frac{2}{3}} = 2^{3 \times \frac{1}{3}} \times 3^{\frac{1}{3} + \frac{2}{3}} = 2 \times 3 = 6$

(2)  $\sqrt[3]{a} \times \sqrt[4]{a^3} \div \sqrt[12]{a} = a^{\frac{1}{3}} \times a^{\frac{3}{4}} \div a^{\frac{1}{12}}$   
 $= a^{\frac{1}{3} + \frac{3}{4} - \frac{1}{12}} = a^1$   
 $= a$

**問 9** 次の計算をせよ。

(1)  $7^{\frac{1}{2}} \div 7^{\frac{1}{6}} \times 7^{\frac{2}{3}}$                       (2)  $(16^{\frac{1}{6}})^{-\frac{3}{2}}$                       (3)  $\left(\frac{5}{3}\right)^{\frac{5}{2}} \times 27^{\frac{1}{2}} \div 5^{\frac{3}{2}}$

→ p.161 問題3

**問 10** 次の式を簡単にせよ。

(1)  $\sqrt[4]{a} \times \sqrt[8]{a^3} \div \sqrt{a}$                       (2)  $\sqrt[3]{ab^2} \div \sqrt[6]{a^5 b} \times \sqrt{a}$

→ p.161 問題4

指数  $p$  が無理数のときにも、正の数  $a$  に対して  $a^p$  が定義される。

たとえば、 $\sqrt{2} = 1.41421\dots$  に対して、有理数を指数とする 3 の累乗の列

$3^1, 3^{1.4}, 3^{1.41}, 3^{1.414}, 3^{1.4142}, 3^{1.41421}, \dots$

を考えると、その項は右のようになり、しだいに一定の値に近づいていくから、その値を  $3^{\sqrt{2}}$  と定める。

累乗の指数を、このように実数にまで拡張

しても、上の指数法則はそのまま成り立つ。

$3^1$	$= 3$
$3^{1.4}$	$= 4.65553672\dots$
$3^{1.41}$	$= 4.70696500\dots$
$3^{1.414}$	$= 4.72769503\dots$
$3^{1.4142}$	$= 4.72873393\dots$
$3^{1.41421}$	$= 4.72878588\dots$
	$\dots\dots\dots$

## 4 指数関数とそのグラフ

$a > 0, a \neq 1$  のとき

$$y = a^x$$

で表される関数を、 $a$  を てい底 とする **指数関数** という。

### 指数関数のグラフ

2 を底とする指数関数  $y = 2^x$  のグラフについて考えてみよう。

たとえば、 $x$  が  $\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, -\frac{1}{2}$  のときの  $2^x$  の値は、次のようになる。

$$2^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2} \doteq 1.41, \quad 2^{\frac{3}{2}} = 2^{1+\frac{1}{2}} = 2 \times 2^{\frac{1}{2}} = 2\sqrt{2} \doteq 2.83$$

$$2^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2^{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \doteq 0.71$$

いろいろな  $x$  の値に対応する  $2^x$  の値は次の表のようになる。

$x$	...	-2	$-\frac{3}{2}$	-1	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{3}{2}$	2	...
$y = 2^x$	...	0.25	0.35	0.5	0.71	1	1.41	2	2.83	4	...


**問11**  $x$  の値が  $-\frac{5}{2}, \frac{5}{2}$  のときの  $2^x$  の値を求めよ。

上のように、 $x$  の値に対する  $y$  の値を求め、 $x, y$  の値の組  $(x, y)$  を座標とする点を座標平面上にとっていくと、右の図のような曲線が得られる。

これが指数関数

$$y = 2^x$$

のグラフである。



**問12**  $y = 3^x$  のグラフをかけ。

指数関数  $y = 2^x$  のグラフと  $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$  のグラフを比べてみよう。


$x$	...	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	...
$y = 2^x$	...	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	4	8	16	...
$y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$	...	16	8	4	2	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$	...

$y = 2^x$  と  $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x = 2^{-x}$

とでは、 $x$  と  $-x$  が入れかわっている。

したがって、 $y = 2^x$  のグラフと

5  $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$  のグラフは、 $y$  軸に関して対称である。





一般に、関数  $y = a^x$  のグラフと関数  $y = \left(\frac{1}{a}\right)^x$  のグラフは、 $y$  軸に関して対称である。

指数関数  $y = a^x$  のグラフは

10  $a > 1$  のときは、 $y = 2^x$  のグラフと同様に右上がりの曲線

$0 < a < 1$  のときは、 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$  のグラフと同様に右下がりの曲線となる。



問13  $y = 3^x$  のグラフをもとにして、 $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$  のグラフをかけ。

## 指数関数の性質

指数関数  $y = a^x$  の性質をまとめると、次のようになる。

- ① 定義域は **実数全体**，値域は **正の実数全体** である。
- ② グラフは点  $(0, 1)$  および点  $(1, a)$  を通り， $x$  軸が漸近線になる。
- ③  $a > 1$  のとき， $x$  の値が増加すると  $y$  の値も増加する。

$$\text{すなわち} \quad p < q \iff a^p < a^q$$

$0 < a < 1$  のとき， $x$  の値が増加すると  $y$  の値は減少する。

$$\text{すなわち} \quad p < q \iff a^p > a^q$$

$a > 1$  のときの  $y = a^x$  のように， $x$  の値が増加すると  $y$  の値も増加する関数を **増加関数** といい， $0 < a < 1$  のときの  $y = a^x$  のように， $x$  の値が増加すると  $y$  の値が減少する関数を **減少関数** という。

5

10

### 例題

大小比較

1 3つの数  $2\sqrt{2}$ ， $\sqrt[3]{32}$ ， $\sqrt[4]{32}$  の大きさを比較せよ。

解 3つの数を  $2^p$  の形に表すと

$$2\sqrt{2} = \sqrt{2^3} = 2^{\frac{3}{2}}$$

$$\sqrt[3]{32} = \sqrt[3]{2^5} = 2^{\frac{5}{3}}$$


$$\sqrt[4]{32} = \sqrt[4]{2^5} = 2^{\frac{5}{4}}$$

ここで， $y = 2^x$  の底 2 は 1 より

大きく， $\frac{5}{4} < \frac{3}{2} < \frac{5}{3}$  であるから

$$2^{\frac{5}{4}} < 2^{\frac{3}{2}} < 2^{\frac{5}{3}}$$

すなわち  $\sqrt[4]{32} < 2\sqrt{2} < \sqrt[3]{32}$



15

20

問14 次の3つの数の大きさを比較せよ。

(1)  $\sqrt[3]{9}$ ， $\sqrt[5]{81}$ ， $\sqrt[7]{243}$

(2)  $\sqrt{\frac{1}{2}}$ ， $\sqrt[4]{\frac{1}{8}}$ ， $\sqrt[3]{\frac{1}{4}}$

## 指数関数を含む方程式・不等式

$a > 0$ ,  $a \neq 1$  のとき, 次のことが成り立つ。

$$a^p = a^q \iff p = q$$

このことを用いて, 指数関数を含む方程式を解いてみよう。

5 **例題** 指数関数を含む方程式 [1]

**2** 方程式  $4^{2x} = 2^{x-6}$  を解け。

**解**  $4^{2x} = (2^2)^{2x} = 2^{4x}$  であるから

$$2^{4x} = 2^{x-6}$$

◀ 両辺の底をそろえる

よって  $4x = x - 6$

ゆえに  $x = -2$

10

**問15** 次の方程式を解け。

(1)  $25^{1-x} = 5^x$

(2)  $\frac{1}{49^{2x}} = 7^{6-x}$

**応用** 指数関数を含む方程式 [2]

**例題**

**3** 方程式  $9^x - 3 = 2 \cdot 3^x$  を解け。

**解**  $9^x = (3^2)^x = 3^{2x} = (3^x)^2$  であるから  $(3^x)^2 - 3 = 2 \cdot 3^x$

ここで,  $3^x = t$  とおくと,  $t > 0$  であって

$$t^2 - 3 = 2t$$

$$t^2 - 2t - 3 = 0$$

$$(t+1)(t-3) = 0$$

$t > 0$  より  $t = 3$

すなわち  $3^x = 3$

ゆえに  $x = 1$

20

**問16** 次の方程式を解け。

(1)  $\left(\frac{1}{9}\right)^x + 2 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^x - 3 = 0$

(2)  $2 \cdot 4^x + 4 = 9 \cdot 2^x$

指数関数の性質を用いて、指数関数を含む不等式を解いてみよう。

応用  
例題

指数関数を含む不等式

4

次の不等式を解け。

$$(1) \left(\frac{1}{5}\right)^x \leq \left(\frac{1}{25}\right)^{x-1} \qquad (2) 4^{x+1} - 5 \cdot 2^x + 1 > 0$$

解

(1)  $\frac{1}{25} = \left(\frac{1}{5}\right)^2$  であるから、与えられた不等式は

$$\left(\frac{1}{5}\right)^x \leq \left(\frac{1}{5}\right)^{2(x-1)}$$

底  $\frac{1}{5}$  は 0 より大きく 1 より小さいから

$$x \geq 2(x-1)$$

ゆえに

$$x \leq 2$$

$$(2) 4^{x+1} = 4 \cdot 4^x = 4 \cdot (2^2)^x = 4 \cdot 2^{2x} = 4 \cdot (2^x)^2$$

であるから、与えられた不等式は

$$4 \cdot (2^x)^2 - 5 \cdot 2^x + 1 > 0$$

ここで、 $2^x = t$  とおくと、 $t > 0$  であって

$$4t^2 - 5t + 1 > 0$$

$$(4t-1)(t-1) > 0$$

$$t < \frac{1}{4}, \quad 1 < t$$

$t > 0$  であるから  $0 < t < \frac{1}{4}, \quad 1 < t$

すなわち  $0 < 2^x < 2^{-2}, \quad 2^0 < 2^x$

底 2 は 1 より大きいから

$$x < -2, \quad 0 < x$$

$y = \left(\frac{1}{5}\right)^x$  は  
減少関数

$t = 2^x$  は  
増加関数

5

10

15

20

問17 次の不等式を解け。

$$(1) (\sqrt{7})^x < 49^{3-2x} \qquad (2) 9^x - 4 \cdot 3^x + 3 > 0$$

## 問題

1 次の計算をせよ。

(1)  $\left(\frac{2}{3}\right)^4 \div 2^{-3} \times 3^5$

(2)  $\frac{10^7 \times 10^{-3}}{10^{-2} \div 10^{-4}}$  → p.174 練習問題2

2 次の式を簡単にせよ。

(1)  $(a^3)^{-2} \div a^{-8}$

(2)  $x^8 \div (x^{-2})^{-3} \times \left(\frac{1}{x}\right)^5$

3 次の計算をせよ。

(1)  $(-\sqrt[4]{49})^2$

(2)  $\sqrt[5]{64} \div \sqrt[10]{4}$

(3)  $\left\{\left(\frac{9}{16}\right)^{-\frac{2}{3}}\right\}^{\frac{3}{4}}$

(4)  $(2 \times 3^2)^{\frac{2}{3}} \div 2^{-\frac{4}{3}} \div \sqrt[3]{3}$

4 次の式を簡単にせよ。

(1)  $\frac{\sqrt[4]{a^3} \sqrt[3]{a^2}}{\sqrt[12]{a^{11}}}$

(2)  $(a^{\frac{1}{2}} + b^{\frac{1}{2}})(a^{\frac{1}{2}} - b^{\frac{1}{2}})$

(3)  $(a^{\frac{1}{3}} - b^{\frac{1}{3}})(a^{\frac{2}{3}} + a^{\frac{1}{3}}b^{\frac{1}{3}} + b^{\frac{2}{3}})$

5  $(\sqrt{2})^6$ ,  $(\sqrt[3]{3})^6$  の値を計算することにより, 2つの数  $\sqrt{2}$ ,  $\sqrt[3]{3}$  の大小を比較せよ。6  $y = 2^x$  のグラフをもとにして,  $y = 2^{x-1}$  のグラフをかけ。

7 次の各組の数を小さい方から順に並べよ。

(1)  $\sqrt[4]{27}$ ,  $9^{\frac{1}{3}}$ ,  $\sqrt[6]{3^5}$

(2)  $\sqrt{2}$ ,  $\sqrt[3]{2}$ ,  $\sqrt[5]{4}$ ,  $\sqrt[3]{8}$ ,  $\sqrt[7]{16}$

→ p.175 練習問題11

8 次の方程式を解け。

(1)  $4^x = 2^x \cdot 8^{x+1}$

(2)  $3^{2x+1} + 2 \cdot 3^x - 1 = 0$

9 次の不等式を解け。

(1)  $0.125 < 0.5^x < 1$

(2)  $\left(\frac{1}{4}\right)^x - \left(\frac{1}{2}\right)^x \leq 2$

(3)  $4^x + 2^{x+2} - 32 \geq 0$